


Actieve kool (Carbo activatus)

Adsorbens.

Het heeft een enterosorbent, ontgiftend en antidiarree effect. Behoort tot de groep van polyvalente fysisch-chemische antidota, heeft een hoge oppervlakteactiviteit.

Adsorbeert gifstoffen en gifstoffen uit het maagdarmkanaal voordat ze worden opgenomen, incl. alkaloïden, glycosiden, barbituraten en andere hypnotica en narcotica, zouten van zware metalen, toxinen van bacteriële, plantaardige, dierlijke oorsprong, derivaten van fenol, blauwzuur, sulfonamiden, gassen. Het adsorbeert ook een teveel aan sommige stofwisselingsproducten - bilirubine, ureum, cholesterol, endogene metabolieten die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van endogene toxicose. Adsorbeert zwak zuren en basen (inclusief ijzerzouten, cyaniden, methanol, ethyleenglycol). Irriteert het maag-darmslijmvlies niet.



Kartalin-creme.nl

Indicaties

- Gebruikt als ontgiftingsmiddel voor exogene en endogene intoxicaties van verschillende oorsprong.
- Bij de complexe behandeling van voedselvergiftiging, salmonellose, dysenterie.
- In geval van vergiftiging met drugs (psychotrope, slaappillen, verdovende middelen, etc.), alkaloïden, zouten van zware metalen en andere vergiften.
- Bij ziekten van het maagdarmkanaal, vergezeld van dyspepsie, winderigheid.
- Met voedsel- en medicijnenallergieën.
- Bij hyperbilirubinemie (virale hepatitis en andere geelzucht) en hyperazotemie (nierfalen).
- Om gasvorming in de darmen te verminderen

Dosering en administratie

Dosering en administratie

Binnen genomen. Het doseringsregime is individueel, afhankelijk van de indicaties, de klinische situatie en de leeftijd van de patiënt.

Neem gemiddeld één tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dat wil zeggen, met een lichaamsgewicht van 80 kg is het toegestaan om 8 tabletten tegelijk in te nemen. 2-4 keer per dag. Drink water.

Het verloop van de behandeling voor acute ziekten is 3-5 dagen, voor allergieën en chronische ziekten - tot 14 dagen.

Herhaalde cursus - na 2 weken op aanbeveling van een arts.

Bijwerking

Mogelijk: dyspepsie, obstipatie, diarree, donkere verkleuring van de ontlasting

Geneesmiddel interactie

Geactiveerde kool heeft adsorberende eigenschappen en kan, wanneer het gelijktijdig met andere geneesmiddelen wordt ingenomen, hun opname uit het maagdarmkanaal aanzienlijk verminderen, wat leidt tot een afname van de effectiviteit van andere geneesmiddelen.

Kartalin-creme.nl